Germes banals Recherche standard	- Utiliser le **kit eSwab** à bouchon **rose** - Prélever au niveau des parois vaginales et exocol - Exprimer et casser l'écouvillon dans le milieu de transport	
Gonocoque Recherche standard. En cas de grossesse, à rechercher seulement si cervicite ou IST	- Utiliser le **kit eSwab** à bouchon **orange** - Prélever au niveau de l'endocol. - Exprimer et casser l'écouvillon dans le milieu de transport	
Dépistage Streptocoque du groupe B	- Balayer les parois vaginales en insistant sur le 1/3 inférieur du vagin jusqu'au vestibule, **sans spéculum** **1**. Utiliser le **kit eSwab** à bouchon **rose** pour le dépistage standard entre 34 et 38 SA par culture **2.** Utiliser le **Kit COPAN** avec double écouvillon pour le dépistage par PCR GeneXpert (bouchon **rouge**)	**1** **2**
Mycoplasmes génitaux ***(Ureaplasma sp* et *Mycoplasma hominis)*** Recherche particulière	- Utiliser un écouvillon en viscose (bouchon blanc) - Prélever au niveau des parois vaginales ou endocol - Exprimer l'écouvillon dans le milieu de transport **Mycoplasma DUO** (**petit flacon à bouchon vert**) et l'éliminer dans la poubelle appropriée	
Chlamydia trachomatis Recherche particulière	- Utiliser le **kit Xpert® CT/NG** à bouchon **rose** - Eliminer soigneusement les sécrétions de l'exocol avec le 1er écouvillon à extrémité large - Introduire le 2 ème écouvillon dans l'orifice externe du col en lui imprimant un mouvement de rotation. - Exprimer et casser l'écouvillon dans le milieu de transport	